

## فرم درخواست بیوپسی عضله

تاریخ

شماره پاتولوژی

نام خانوادگی نام  
محل تولد تلفن  
علت مراجعه

زمان شروع علائم

سابقه پزشکی خاص: دارد  ندارد  توضیح:

سابقه خانوادگی: دارد  ندارد  نسبت فامیلی والدین: دارد  ندارد

مصرف دارو: دارد  ندارد  توضیح:

### معاینات

ضعف عضلانی  اندام فوقانی پروگزیمال  /۵ دیستال  /۵

اندام تحتانی پروگزیمال  /۵ دیستال  /۵

درگیری عضلات صورت  درگیری عضلات گردن

خستگی عضلانی  عدم تحمل فعالیت

کرامپ

آتروفی  هایپرتروفی

دیلمبوی  دیسفاژی

میوتونی  میالژی

مشکل قلبی  مشکل تنفسی

میوگلوبینوری

علائم پوستی

CK= Aldolase= AST= ALT=

نوروژن

الکترومیوگرافی: میوژن

ام ار آی عضله

محل بیوپسی:

تشخیص های افتراقی بالینی:

پزشک درخواست کننده

## توصیه های بعد از بیوپسی عضله

- ۱- در روز بیوپسی از آسپرین استفاده نکنید.
- ۲- اندام مورد بیوپسی آویزان باقی نماند.
- ۳- به مدت ۲ ساعت بعد از بیوپسی از کمپرس یخ استفاده شود (پانسمان خیس نشود).
- ۴- تا ۴۸ ساعت بعد از بیوپسی پانسمان خیس یا تعویض نشود.
- ۵- تا ۴۸ ساعت از اندام مورد بیوپسی استفاده نشود و تا یک هفته به اندام مورد بیوپسی فشار نیاید (از عصا برای راه رفتن استفاده شود یا چیزی با دست حمل نشود).
- ۶- در صورت درد هر ۶ ساعت استامینوفن یا بروفن میل شود.
- ۷- ۲ و ۵ و ۸ روز بعد از بیوپسی پانسمان استریل تعویض شود.
- ۸- ۸ روز بعد از بیوپسی بخیه ها کشیده شود.
- ۹- تا ۱۵ روز ورزش نکنید.