

مرکز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکان
فرم پرسشنامه (1) اندیکاسیون اندوسکوپی در کودکان

نام و نام خانوادگی: سن: جنس: شماره پرونده: کد: شماره تماس: آدرس: تکمیل کننده فرم:

۱- وضعیت رشد و تکامل				
وزن	قد	دورسر	Z-Score	BMI
۲- وضعیت تکامل عصبی را مشخص نمایید.				
سالم	اوتیسم	عقب افتاده ذهنی	بیش فعال	سایر موارد

۳- وضعیت نگهداری کودک را تعیین نمایید.					
دو والدی	تک والدی پدر	تک والدی مادر	مراقب پرستار	مراقب غیر پرستار	پدر بزرگ/مادر بزرگ

۴- وضعیت فرهنگی اجتماعی خانواده را تعیین نمایید.									
وضعیت تحصیلات والدین	بی سواد	سیکل	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	دکتر	شغل	خانه دار
پدر									
مادر									
پرستار									
سایر مراقبین کودک									

۵- بیمار با کدامیک از علائم جهت انجام اندوسکوپی مراجعه نموده است؟						
اجتناب از خوردن	استفراغ مکرر	استفراغ حاوی خون لخته	هماتمز	تهوع	دیسفاژی	درد حاد شکم
بررسی پولیپ	بلع مواد سوزاننده	بلع اجسام خارجی	سلیاک	سوء جذب	آشالازی	درد مزمن شکم
گاستروستومی	بیماری التهابی روده	کنترل خونریزی گوارشی	واریس مری	سوء تغذیه	تنگی مری و بالون	ریفلاکس
بدخیمی	روده تحریک پذیر	اندوسکوپی فالوآپ	رد انسداد	آلرژی غذایی	گیر کردن لقمه غذایی	

۶- آیا بیمار از مراکز دیگری ارجاع شده است نام بیمارستان و سطح پزشک ارجاع دهنده را مشخص نمایید.			
بیمارستان ارجاع دهنده	پزشک عمومی	پزشک متخصص	پزشک فوق تخصص

۷- یافته های اندوسکوپی توسط پزشک فوق تخصص گوارش تکمیل گردد.							
طناب صوتی							
سالم	اریتم یا التهاب	هموراژیک	زخم	تاولی	ندول	سایر موارد	
مری							
سالم	ازوفاژیت	زخم مری	تنگی مری	پرفوراسیون	واریس	ازوفاژیت کانیدیا	ازوفاژیتال رینگ
نکروز مری	هرنیا	دیورتیکول	مری نای مانند	خطوط طولی مری	دوپلیکاسیون	سپتوم داخل لومن مری	جابجایی Z-line

معده					
سالم	آنترال گاستریت	زخم معده	ندولاریتی منتشر	هیپرتروفیک گاستروپاتی	هیپرتانسیو گاستروپاتی
پولیپ معده	واریس معده	اروزیو گاستریت	واریولیفرم گاستریت	مجرای اکتوپیک پانکراس	انسداد پیلور

۸- دئودنوم و ژژنوم										
جسم خارجی	لنفانژکتازی	نشانه زمین برفی	آتروفی ویلوس	انسداد/ وب	خونریزی فعال	اسکار زخم قبلی	زخم	اریتم	ندولاریتی	
										بولب دئودنوم
										قسمت دوم دئودنوم
										قسمت سوم دئودنوم
										ابتدای ژژنوم

۹- پیامد حاد ناشی از اندوسکوپی را مشخص نمایید.						
بدون عارضه	پرفوراسیون مری	پرفوراسیون معده	پنومومدیاستن	پنوموتوراکس	مدیاستینیت	شوگ و مرگ

۱۰- اقدامات بیهوشی						
بدون تراکتال انتوباسیون		داروی بیهوشی			عوارض بیهوشی	
	میدازولام	پروپوفول	هیپوکسی موقت	برونکواسپاسم	آپنه تنفسی	
با تراکتال انتوباسیون	کتامین	آتروپین	هیپوتانسیون	تاکی کاردی		
	فنتالین	اندانسترون	هیپر تانسیون	برادیکاردی		
			آریتمی	ایست قلبی		

*خواهشمند است موارد درخواست شده در پرسشنامه پس از اخذ شرح حال و معاینه بالینی توسط کارشناس و پزشک معالج بدقت تکمیل و در قسمت پایینی هر مورد تیک زده شود.
۱: در صورت

Reference:

1. Walker's pediatric gastrointestinal and liver disease 5edit;2008
2. Walker's pediatric gastrointestinal and liver disease 6edit;2018
3. Wyllie pediatric gastrointestinal disease. 5edit:2016:206-222.
4. Guide line for caustic ingestion. ESPGHAN:2015;