

مرکز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکان

فرم پرسشنامه شماره ۳ اندوسکوپی در کودکان با بلع اجسام جامد و آسیب رسان

نام و نام خانوادگی: سن: جنس: شماره پرونده: کد: نام تکمیل کننده فرم: شماره تماس: آدرس:

۱- وضعیت رشد و تکامل کودک را تکمیل نمایید.									
BMI	Z-Score	دورسر		قد	وزن				
۲- وضعیت تکامل عصبی را مشخص نمایید.									
سالم	اوتیسم	عقب افتاده ذهنی	بیش فعال	سایر موارد					
۳- وضعیت فرهنگی اجتماعی خانواده را تعیین نمایید.									
وضعیت تحصیلات والدین	بی سواد	سیکل	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	دکتر	شغل	خانه دار
پدر									
مادر									
پرستار									
سایر مراقبین کودک									

۴- وضعیت نگهداری کودک را تعیین نمایید.						
دو والدی	تک والدی پدر	تک والدی مادر	مراقب پرستار	مراقب غیر پرستار	پدر بزرگ/مادر بزرگ	سایر موارد

۶- نوع اجسام بلعیده شده را مشخص نمایید.

۵- مشخصات اجسام بلعیده را مشخص نمایید.											
اندازه			تعداد			شکل			کیفیت		
کوچک زیر ۲ سانت	متوسط ۲ تا ۵ سانت	بزرگ بیش از ۵ سانت	قطر	دایره	مربع	مستطیل	مثلث	نوک تیز	گرد	سوزاننده	
سکه	باتری ساعت	باتری قلمی	آهنربا	میخ	پیچ	سوزن	گوشواره	هسته میوه	قطعات اسباب بازی	شیشه	تیغ ماهی
پونس	استخوان	سوزن قلمی	کلید	گوی فلزی	قطعات چوبی	گیرمو/کلیپس	قطعات الکترونیک	گوشت	سایر مواد غذایی		

۷- محل قرار گیری جسم بلعیده در دستگاه گوارش را تعیین نمایید.								
بالای ترقوه	مری فوقانی	مری میانی	مری تحتانی	معدده	پیلور	بولب دئودنوم	قسمت دوم دئودنوم	بعد از دئودنوم

۸- چگونگی بروز بلع اجسام خارجی را ذکر نمایید.						
اتفاقی و تصادفی	عمدی	خودکشی	کودک آزاری	بلع مشاهده شده	بلع ماده مشاهده نشده	سایر موارد

۹- فاصله زمانی بلع جسم بلعیده تا زمان انجام اندوسکوپی مراجعه به بیمارستان را مشخص نمایید.						
کمتر از ۶ ساعت	۶-۱۲ ساعت	۱۲-۲۴ ساعت	۲۴-۷۲ ساعت	۳-۷ روز	بیش از ۷ روز	سایر

۱۰- مدت زمان ارجاع از اولین ویزیت توسط پزشک یا مراکز بهداشتی درمانی به بیمارستان (در صورت ارجاع)						
کمتر از ۶ ساعت	۶-۱۲ ساعت	۱۲-۱۸ ساعت	۱۸-۲۴ ساعت	۲۴-۷۲ ساعت	بیش از ۷۲ ساعت	بیمارستان ارجاع دهنده

۱۱- مشخصات پزشک ارجاع دهنده بیمار را مشخص نمایید.				
مراجعه مستقیم بیمار به اورژانس	اورژانس ۱۱۵	پزشک عمومی	پزشک متخصص	پزشک فوق تخصص

۱۲- بیمار با کدامیک از علائم زیر مراجعه نموده است؟

اجتناب از خوردن	اجتناب از نوشیدن	استفراغ	استفراغ خونی	تهوع	افزایش بزاق	دیسفاژی	بدون علامت
درد قفسه سینه	دیسترس تنفسی	کاهش سطح هوشیاری	سیانوز	سرفه	درد شکم		
ایست تنفسی	بیقراری	احساس وجود جسم خارجی	خفگی	تب	سایر		

۱۳- بیمار در معاینه بالینی دارای کدامیک از یافته های زیر است؟

دیسترس تنفسی / تنفس صدادار	تاکی پنه	تاکیکاردی	بیقراری	لتارژی
آمفیزم	کریپیتاسیون گردن و سینه	شوک	تندرنس شکم	درجه تب
زخم اطراف دهان	زخم حفره دهان	خونریزی گوارشی	سیانوز	بدون علامت

۱۴- یافته های اندوسکوپی توسط پزشک فوق تخصص گوارش تکمیل گردد.

ارگان آسیب دیده						
اوروفارینکس*						
سالم	زخم مخاط دهانی	نکروز	سالم	اریتم یا التهاب	زخم	پارگی

مری**

سالم	ازوفاژیت موضعی	ازوفاژیت گرید A	ازوفاژیت گرید B	ازوفاژیت گرید C	نکروز/خونریزی مری	پارگی مری

معدة***

سالم	اریتم خفیف موضعی بدون نکروز	اریتم موضعی همراه با نکروز	اریتم منتشر	نکروز وسیع بدون پارگی	نکروز وسیع با پارگی
دئودنوم***					
سالم	اریتم سطحی	زخم کوچک سطحی	زخم کوچک عمقی	زخم بزرگ	پرفوراسیون

۱۵- پیامد حاد بیماری ناشی از بلع اجسام خارجی را مشخص نمایید.

بدون عارضه	پرفوراسیون مری	پرفوراسیون معده	پنوموتوراکس	مدیاستینیت	شوک و مرگ	سایر

۱۶- پیامد طولانی مدت بیماری را مشخص نمایید.

بدون عارضه	تنگی مری قابل درمان با بالون	تنگی مری نیازمند جراحی	ازوفاگوئومی	گاسترکتومی	گاستریک Pull-up

۱۷- اقدامات بیهوشی

بدون تراکتال انتوباسیون			داروی بیهوشی			عوارض بیهوشی		
میدازولام	پروپوفول	هیپوکسی موقت	هیپوکواسپاسم	آپنه تنفسی				
کتامین	آتروپین	هیپوتانسیون	تاکی کاردی					
فنتالین	اندانسترون	هیپرتانسیون	برادیکاردی					
		آریتمی	ایست قلبی					

خواهشمند است موارد درخواست شده در پرسشنامه پس از اخذ شرح حال و معاینه بالینی و اندوسکوپی توسط کارشناس و پزشک معالج بدقت تکمیل و تیک زده و در صورت سایر موارد پر شود.

Reference:

1. Walker's pediatric gastrointestinal and liver disease 5edit;2008
2. Walker's pediatric gastrointestinal and liver disease 6edit;2018
3. Wyllie pediatric gastrointestinal disease. 5edit;2016:206-222.
4. Guide line for caustic ingestion. ESPGHAN